



Catalogo Cicorie

—
CHICORY
CATALOGUE

Cicoria Palla rossa

CHICORY PALLA ROSSA

1 Sel. **Zarlino**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Precoce - 60/65 giorni
Early - 60/65 days



Peso medio | Average weight
300 g



Cespo | Head
Compatto, rosso brillante
Compact, bright red heads

- Varietà con buona tolleranza alla salita a seme
Good bolting tolerance
- Adatta per raccolte da metà settembre/ottobre e per trapianti primaverili
Suitable for harvest from mid-September/October and spring transplantation
- Destinata al mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	20/7	10/8	metà mid SEP
Marche	28/7	10/8	fine end SEP
Fucino	30/4	25/7	fine end JUN
Latina	1/8	25/8	inizio beg OCT
Sud	1/8	15/8	inizio beg OCT



Investimento suggerito
Suggested investment
9-10 piante/m² | 9-10 plants/m²

2 Sel. **Chiozzotto**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Precoce - 70/75 giorni
Early - 70/75 days



Peso medio | Average weight
350 g



Cespo | Head
Omogeneo, pesante, rosso brillante
Homogeneous, heavy, bright red heads

- Varietà con buona tolleranza alla salita a seme
Variety characterized by a good bolting tolerance
- Adatta per raccolte di ottobre
Suitable for harvest in October
- Destinata al mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	10/8	15/8	metà mid OCT
Marche	10/8	20/8	metà mid OCT
Fucino	20/4	10/5	fine end JUN
Latina	10/8	25/8	metà mid OCT
Sud	8/8	15/8	metà mid OCT



Investimento suggerito
Suggested investment
9 piante/m² | 9 plants/m²

3 Sel. **Merlin**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Medio-precoce - 80/85 giorni
Medium-early - 80/85 days



Peso medio | Average weight
350 g



Cespo | Head
Pesante, rosso intenso
Heavy, deep red heads

- Varietà molto produttiva
High-yield variety
- Adatta per raccolte di fine ottobre/inizio novembre
Suitable for harvest in end-October/beginning November
- Destinata al mercato fresco e IV gamma
Suitable for fresh and ready to eat market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	12/8	20/8	fine end OCT
Marche	15/8	20/8	inizio beg NOV
Fucino	20/7	5/8	metà mid OCT
Latina	20/8	5/9	NOV
Sud	15/8	20/8	inizio beg NOV



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

4 Sel. Zemei



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Medio-tardivo - 90/95 giorni
Medium-late - 90/95 days



Peso medio | Average weight
400 g



Cespo | Head
Molto voluminoso, rosso intenso
Very voluminous, deep red

- I voluminosi cespi consentono ottime rese
The voluminous heads allow excellent yields
- Adatta per raccolte in tardo autunno
Suitable for harvest in late autumn
- Adatta al mercato fresco e IV gamma
Suitable for fresh and ready to eat market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	15/8	22/8	metà mid NOV
Marche	17/8	23/8	metà mid NOV
Fucino	25/7	30/7	fine end OCT
Latina	22/8	10/9	fine end NOV
Sud	20/8	25/8	fine end NOV



Investimento suggerito
Suggested investment
7 piante/m² | 7 plants/m²

5 Sel. Renier



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Tardivo - 100/110 giorni
Late - 100/110 days



Peso medio | Average weight
450 g



Cespo | Head
Serrato, rosso vivo
Tightly closed, bright red heads

- Molto resistente alle basse temperature invernali
Very resistant to low winter temperatures
- Adatta per raccolte di fine anno
Suitable for harvest in end year
- Adatta al mercato fresco e IV gamma
Suitable for fresh and ready to eat market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	15/8	25/8	inizio beg DEC
Marche	20/8	28/8	inizio beg DEC
Fucino	30/7	10/8	fine end NOV
Latina	10/9	13/9	metà mid DEC
Sud	22/8	28/8	inizio beg DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
7 piante/m² | 7 plants/m²

6 Sel. Morgan



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Tardivo - 120/125 giorni
Late - 120/125 days



Peso medio | Average weight
500 g



Cespo | Head
Voluminoso, foglie spesse, rosso intenso
Voluminous heads, thick leaves and deep red color

- Varietà resistente alle gelate
Frost resistant variety
- Adatta per raccolte in pieno inverno
Suitable for harvest in middle winter
- Adatta al mercato fresco e IV gamma
Suitable for fresh and ready to eat market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	20/8	28/8	fine end DEC
Marche	25/8	3/9	inizio beg JAN
Fucino	-	-	-
Latina	10/9	18/9	metà mid JAN
Sud	25/8	30/8	fine end DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
7 piante/m² | 7 plants/m²

Cicoria Palla rossa

CHICORY PALLA ROSSA

7 Sel. Drake



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
 Tardivo - 135/145 giorni
 Late - 135/145 days



Peso medio | Average weight
 500 g



Cespo | Head
 Pesante, ben chiuso, rosso vivo
 Heavy and tightly closed heads,
 bright red color

- Varietà con ottima resistenza alle rigide temperature invernali
Variety with high resistance to harsh winter temperatures
- Adatta per raccolte invernali tardive
Suitable for late winter harvest
- Adatta al mercato fresco e IV gamma
Suitable for fresh and ready to eat market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to	da from
Veneto	20/8	28/8	JAN-FEB
Marche	25/8	5/9	JAN-FEB
Fucino	-	-	-
Latina	10/9	15/9	inizio beg FEB
Sud	25/8	30/8	JAN



Investimento suggerito
Suggested investment
 7 piante/m² | 7 plants/m²

Variegata Marinanta



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
 Tardivo - 135/145 giorni
 Late - 135/145 days



Peso medio | Average weight
 500 g



Cespo | Head
 Pesante, uniforme, tipicamente variegato di rosso
 Heavy and uniform heads,
 leaves are typically red variegated

- Varietà particolarmente resistente alle basse temperature invernali
Variety characterized by a particular resistance to low winter temperatures
- Ideale per raccolte di gennaio/febbraio
Ideal for harvest in January/February
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to	da from
Veneto	18/8	28/8	JAN-FEB
Marche	25/8	5/9	JAN-FEB
Fucino	-	-	-
Latina	10/9	15/9	fine end JAN
Sud	25/8	30/8	JAN



Investimento suggerito
Suggested investment
 8 piante/m² | 8 plants/m²



Cicoria Palla bianca

CHICORY PALLA BIANCA



1 Sel. Canabianco P.

- Ciclo - giorni dal trapianto**
Cycle - days after transplant
Precoce - 65/70 giorni
Early - 65/70 days
- Peso medio | Average weight**
350 g
- Cespo | Head**
Voluminoso, rotondo, verde chiaro
con venature bianche
Voluminous, round heads,
light green with white ribs

- Selezione precoce di Radicchio Bianco di Chioggia
Early selection of Radicchio Bianco di Chioggia
- Adatta per raccolte di settembre/ottobre
Suitable for harvest in September/October
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



	Trapianto Transplant		Raccolta Harvest	
	da from	a to	da from	
Veneto	25/7	10/8	inizio beg	OCT
Marche	6/8	12/8	metà mid	OCT
Fucino	30/6	15/7	inizio beg	SEP
Latina	10/8	20/8	metà mid	OCT
Sud	7/8	15/8	metà mid	OCT

- Investimento suggerito**
Suggested investment
8-9 piante/m² | 8-9 plants/m²

2 Sel. Canabianco M.

- Ciclo - giorni dal trapianto**
Cycle - days after transplant
Medio - 85/90 giorni
Medium - 85/90 days
- Peso medio | Average weight**
400 g
- Cespo | Head**
Uniforme, ben chiuso, verde chiaro
con venature bianche
Uniform, tightly closed heads,
light green with white ribs

- Selezione di Radicchio Bianco di Chioggia, molto produttiva
High-yield selection of Radicchio Bianco di Chioggia
- Sopporta bene i primi freddi, adatta per le raccolte di novembre
Well cold resistant, suitable for harvest in November
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



	Trapianto Transplant		Raccolta Harvest	
	da from	a to	da from	
Veneto	15/8	25/8	metà mid	NOV
Marche	15/8	25/8	metà mid	NOV
Fucino	31/7	5/8	fine end	OCT
Latina	20/8	5/9	fine end	NOV
Sud	18/8	25/8	metà mid	NOV

- Investimento suggerito**
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

3 Sel. Canabianco T.

- Ciclo - giorni dal trapianto**
Cycle - days after transplant
Tardivo - 110/120 giorni
Late - 110/120 days
- Peso medio | Average weight**
400 g
- Cespo | Head**
Pesante, ben chiuso, verde chiaro
con venature bianche
Heavy, tightly closed heads,
light green with white ribs

- Selezione tardiva di Radicchio Bianco di Chioggia, molto produttiva
Late selection of Radicchio Bianco di Chioggia, very yield
- Resistente alle gelate, adatta per raccolte di dicembre
Resistant to frost, suitable for harvest in December
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



	Trapianto Transplant		Raccolta Harvest	
	da from	a to	da from	
Veneto	20/8	25/8	metà mid	DEC
Marche	22/8	30/8	metà mid	DEC
Fucino	-	-	-	-
Latina	5/9	10/9	fine end	DEC
Sud	25/8	30/8	metà mid	DEC

- Investimento suggerito**
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

Specialità

CHICORY SPECIALITIES

Giulia



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
 Tardivo - 120/130 giorni + gg forzatura
 Late - 120/130 days + dd forcing



Peso medio | Average weight
 50 g



Cespo | Head
 A rosa aperta, colore rosso intenso
 con sfumature rosa
*Shape of open rose, intense red with
 pink shades*

- Varietà tipo Rosa di Gorizia
Type Rosa di Gorizia variety
- Adatta per raccolte invernali,
 necessita di forzatura
*Suitable for winter harvest,
 requires forcing*
- Adatta al mercato fresco e ristorazione
Suitable for fresh market and catering



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	20/8	30/8	fine end DEC + forcing
Marche	20/8	30/8	fine end DEC + forcing
Fucino	-	-	-
Latina	20/8	25/8	metà mid DEC + forcing
Sud	20/8	30/8	metà mid DEC + forcing



Investimento suggerito
Suggested investment
 7 piante/m² | 7 plants/m²

Titti



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
 Tardivo - 120/130 giorni + gg forzatura
 Late - 120/130 days + dd forcing



Peso medio | Average weight
 50 g



Cespo | Head
 A rosa aperta, giallo canarino
Shape of open rose, canary color

- Varietà tipo Giallo Canarino
Type Giallo Canarino variety
- Adatta per raccolte invernali,
 necessita di forzatura
*Suitable for winter harvest,
 requires forcing*
- Adatta al mercato fresco e ristorazione
Suitable for fresh market and catering



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	20/8	30/8	fine end DEC + forcing
Marche	20/8	30/8	fine end DEC + forcing
Fucino	-	-	-
Latina	20/8	25/8	metà mid DEC + forcing
Sud	20/8	30/8	metà mid DEC + forcing



Investimento suggerito
Suggested investment
 7 piante/m² | 7 plants/m²

Verosa



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
 Tardivo - 120/125 giorni
 Late - 120/125 days



Peso medio | Average weight
 300-350 g



Cespo | Head
 Omogeneo, compatto, di color rosa
 con nervatura ben marcata
*Homogeneous and compact heads,
 pink color with well marked white ribs*

- Varietà di Rosa di Verona, molto produttiva
Rosa di Verona variety, high yield
- Adatta per raccolte
 di dicembre/gennaio
*Suitable for harvest
 in December/January*
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	15/8	22/8	fine end DEC
Marche	22/8	28/8	fine end DEC
Fucino	-	-	-
Latina	5/9	15/9	inizio beg JAN
Sud	20/8	30/8	fine end DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
 8 piante/m² | 8 plants/m²

Mantorosa



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
 Tardivo - 120/125 giorni
 Late - 120/125 days



Peso medio | Average weight
 200-250 g



Cespo | Head
 Compatto, forma allungata
 foglia rosa con costa bianca
*Compact, elongated shape,
 pink leaf with white rib*

- Varietà di Rosa di Mantova,
molto apprezzata per il sapore
delicato e la morbida consistenza
*Rosa di Mantova variety, very appreciated
for the mild taste and the soft texture*
- Adatta per raccolte invernali
Suitable for winter harvest
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	15/8	22/8	fine end DEC
Marche	22/8	28/8	fine end DEC
Fucino	-	-	-
Latina	5/9	15/9	inizio beg JAN
Sud	20/8	30/8	fine end DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
 8 piante/m² | 8 plants/m²

VERONA Costarossa

Nuova selezione della Rossa di Verona caratterizzata
da costa rosso-violacea a maturazione.
Una varietà a ciclo tardivo adatta al mercato fresco.

*New Rossa di Verona selection characterized by red-
purple rib when ripe. Late cycle variety, suitable for
fresh market*



Ciclo - giorni dal trapianto | Cycle - days after transplant
 Tardivo - 125/130 giorni | Late - 125/130 days



Peso medio | Average weight
 350 g



Cespo | Head
 Compatto, con costa rossa
Compact, with red-purple rib



Cicoria Rossa di Treviso Precoce

CHICORY ROSSA DI TREVISO PRECOCE

1 Sel. **Bellamì**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Precoce - 65/70 giorni
Early - 65/70 days



Peso medio | Average weight
300 g



Cespo | Head
Omogeneo, compatto, rosso
intenso brillante
*Compact, homogeneous,
bright red heads*

- Buona tolleranza alla salita a seme
Good bolting resistance
- Varietà con cespi alti circa 20-22 cm
Variety with avg. 20-22 cm tall
- Adatta per raccolte autunnali
e per trapianti primaverili
*Suitable for autumn harvest
and spring transplant*
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to	da from
Veneto	25/7	5/8	inizio beg OCT
Marche	1/8	5/8	inizio beg OCT
Fucino	5/7	15/7	metà mid SEP
Latina	7/8	15/8	metà mid OCT
Sud	7/8	12/8	metà mid OCT



Investimento suggerito
Suggested investment
8-10 piante/m² | 8-10 plants/m²

2 Sel. **Gordon**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Medio - 85/90 giorni
Medium - 85/90 days



Peso medio | Average weight
350 g



Cespo | Head
Ben chiuso a maturazione, rosso
intenso brillante
*Well-closed heads,
bright intense red color*

- Varietà produttiva
Good yield variety
- Varietà con cespi alti circa 25 cm
Variety with avg. 25 cm tall
- Adatta per raccolte autunnali
Suitable for autumn harvest
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to	da from
Veneto	10/8	16/8	inizio beg NOV
Marche	12/8	20/8	metà mid NOV
Fucino	15/7	30/7	inizio beg OCT
Latina	23/8	5/9	fine end NOV
Sud	15/8	20/8	metà mid NOV



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

3 Sel. **Barbarossa**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Tardivo - 110/120 giorni
Late - 110/120 days



Peso medio | Average weight
400 g



Cespo | Head
Pesante, omogeneo, rosso intenso
*Homogeneous, heavy,
intense red heads*

- Varietà molto produttiva,
con cespi alti fino a 30 cm
High-yield variety, up to 30 cm tall
- Adatta per raccolte invernali
Suitable for winter harvest
- Adatta per il mercato fresco
ed alla frigoconservazione
*Suitable for fresh market and
for refrigeration storage*



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to	da from
Veneto	15/8	22/8	inizio beg DEC
Marche	15/8	22/8	metà mid DEC
Fucino	-	-	-
Latina	1/9	10/9	fine end DEC
Sud	15/8	20/8	metà mid DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

Cicoria Rossa di Treviso Tardiva



CHICORY ROSSA DI TREVISO TARDIVA

1 Sel. **Dolfin**



Ciclo - giorni dal trapianto

Cycle - days after transplant

Precoce - 100 giorni + gg forzatura

Early - 100 days + dd forcing



Peso medio | Average weight

270-370 g



Cespo | Head

Regolare, uniforme e dotato di buona consistenza

Uniform and good firm heads

- Varietà da sottoporre a forzatura-imbianchimento dopo la raccolta
Variety to be subdued to forcing after harvest
- Si ottengono foglie di colore rosso vivo ai bordi e nervatura principale completamente bianca
The obtained leaves have intense red color with contrasting white main rib
- Adatta per mercato fresco e ristorazione
Suitable for fresh market and catering



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	1/8	10/8	metà mid NOV + forcing
Marche	1/8	10/8	metà mid NOV + forcing
Fucino	20/7	30/7	fine end OCT+ forcing
Latina	12/8	18/8	fine end NOV+ forcing
Sud	10/8	15/8	fine end NOV+ forcing



Investimento suggerito

Suggested investment

7-8 piante/m² | 7-8 plants/m²

2 Sel. **Rinaldi**



Ciclo - giorni dal trapianto

Cycle - days after transplant

Medio-tardivo - 130 giorni + gg forzatura

Medium-late - 130 days + dd forcing



Peso medio | Average weight

270-370 g



Cespo | Head

Foglie avvolgenti che tendono a chiudere l'apice

Enveloping leaves tend to close at the apex

- Varietà da sottoporre a forzatura-imbianchimento dopo la raccolta
Variety to be subdued to forcing after harvest
- Si ottengono foglie di colore rosso vivo ai bordi e nervatura principale completamente bianca
The obtained leaves have intense red color with contrasting white main rib
- Adatta per mercato fresco e ristorazione
Suitable for fresh market and catering



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	1/8	10/8	metà mid DEC + forcing
Marche	1/8	10/8	metà mid DEC + forcing
Fucino	-	-	-
Latina	16/8	24/8	fine end DEC + forcing
Sud	15/8	20/8	fine end DEC + forcing



Investimento suggerito

Suggested investment

7-8 piante/m² | 7-8 plants/m²

Cicoria Rossa di Verona

CHICORY ROSSA DI VERONA

1 Sel. Arena Precoce



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Precoce - 60/65 giorni
Early - 60/65 days



Peso medio | Average weight
250 g



Cespo | Head
Uniforme, rosso intenso brillante,
nervatura bianca marcata
*Uniform heads, intense red,
marked white ribs*

- Varietà resistente alla salita a seme
Bolting resistant variety
- Adatta per raccolte in ottobre
e per trapianti primaverili
*Suitable for harvest in October
and spring transplantation*
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	1/8	10/8	inizio beg OCT
Marche	5/8	12/8	metà mid OCT
Fucino	1/6	30/6	inizio beg AUG
Latina	12/8	18/8	metà mid OCT
Sud	6/8	10/8	metà mid OCT



Investimento suggerito
Suggested investment
9-10 piante/m² | 9-10 plants/m²

2 Sel. Arena Media



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Medio - 80/85 giorni
Medium - 80/85 days



Peso medio | Average weight
300 g



Cespo | Head
Omogeneo, compatto, rosso intenso
nervatura bianca marcata
*Homogeneous, compact heads,
intense red, marked white ribs*

- Varietà produttiva
Good yield variety
- Adatta per raccolte di novembre
Suitable for harvest in November
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	10/8	15/8	inizio beg NOV
Marche	15/8	20/8	inizio beg NOV
Fucino	20/7	31/7	inizio beg OCT
Latina	20/8	5/9	metà mid NOV
Sud	15/8	20/8	inizio beg NOV



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

3 Sel. Arena Tardiva



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Tardivo - 110/120 giorni
Late - 110/120 days



Peso medio | Average weight
350 g



Cespo | Head
Uniforme, ben serrato, rosso vivo
*Uniform, tightly closed heads,
bright red color*

- Varietà resistente al freddo
Cold resistant variety
- Adatta per raccolte di dicembre/gennaio
Suitable for harvest in December/January
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	15/8	22/8	inizio beg DEC
Marche	22/8	28/8	metà mid DEC
Fucino	-	-	-
Latina	5/9	12/9	fine end DEC
Sud	22/8	30/8	metà mid DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

Cicoria Variegata di Lusìa

CHICORY VARIEGATA DI LUSIA



1 Sel. **Bornio Precoce**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Precoce - 60/65 giorni
Early - 60/65 days



Peso medio | Average weight
300 g



Cespo | Head
Rotondeggiante, grumolo centrale
compatto, bianco-crema screziato di rosso
*Rounded heads and compact heart,
cream-white leaves dappled of red*

- Buona tolleranza alla salita a seme
Good bolting resistance
- Varietà ideale per raccolte
primaverili e autunnali
*Variety ideal for spring and
autumn harvest*
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to	da from
Veneto	20/7	10/8	metà mid SEP
Marche	31/7	10/8	inizio beg OCT
Fucino	1/6	30/6	inizio beg AUG
Latina	5/8	18/8	metà mid OCT
Sud	5/8	15/8	metà mid OCT



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

2 Sel. **Bornio Media**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Medio - 80/90 giorni
Medium - 80/90 days



Peso medio | Average weight
350 g



Cespo | Head
Rotondo, compatto, bianco-crema
screziato di rosso
*Rounded, compact heads,
cream-white leaves dappled of red*

- Varietà molto produttiva
High-yield variety
- Buona resistenza al freddo
Well cold resistant
- Adatta per raccolte di novembre
Suitable for harvest in November
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to	da from
Veneto	12/8	20/8	inizio beg NOV
Marche	15/8	20/8	metà mid NOV
Fucino	20/7	31/7	inizio beg OCT
Latina	20/8	31/8	inizio beg NOV
Sud	16/8	22/8	inizio beg NOV



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

3 Sel. **Bornio Tardiva**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Tardivo - 115/125 giorni
Late - 115/125 days



Peso medio | Average weight
400 g



Cespo | Head
Compatto, molto pesante, bianco-
crema screziato di rosso
*Compact, heavy, cream-white
leaves red variegated*

- Varietà resistente al freddo
Cold resistant variety
- Adatta per raccolte
di dicembre/gennaio
*Suitable for harvest
in December/January*
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to	da from
Veneto	16/8	25/8	metà mid DEC
Marche	20/8	25/8	metà mid DEC
Fucino	-	-	-
Latina	28/8	5/9	fine end DEC
Sud	20/8	25/8	metà mid DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

Cicoria Variegata di Castelfranco

CHICORY VARIEGATA DI CASTELFRANCO

1 Sel. **Giorgione**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Precoce - 65/70 giorni
Early - 65/70 days



Peso medio | Average weight
250-300 g



Cespo | Head
Giallo-crema con punteggiature
dal rosso al viola
*Cream-yellow leaves evenly
variegated from red to purple*

- Varietà adatta per raccolte
di ottobre utilizzabile anche
in trapianti primaverili
*Variety suitable for October harvest
and usable also for spring transplant*
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	25/7	10/8	inizio beg OCT
Marche	1/8	10/8	inizio beg OCT
Fucino	10/6	20/6	fine end AUG
Latina	1/8	15/8	inizio beg OCT
Sud	1/8	10/8	inizio beg OCT



Investimento suggerito
Suggested investment
8 piante/m² | 8 plants/m²

2 Sel. **Tiepolo**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Medio - 85/95 giorni
Medium - 85/95 days



Peso medio | Average weight
300-350 g



Cespo | Head
Giallo-crema con punteggiature
dal rosso al viola
Cream-yellow leaves dotted of red

- Varietà molto omogenea e produttiva
Variety very uniform and yield
- Adatta per raccolte di novembre
Suitable for harvest in November
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	13/8	20/8	inizio beg NOV
Marche	18/8	22/8	metà mid NOV
Fucino	25/7	5/8	metà mid OCT
Latina	20/8	10/9	metà mid NOV
Sud	15/8	22/8	metà mid NOV



Investimento suggerito
Suggested investment
7 piante/m² | 7 plants/m²

3 Sel. **Bellini**



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Tardivo - 105/115 giorni
Late - 105/115 days



Peso medio | Average weight
400-500 g



Cespo | Head
Pesante, omogeneo, giallo-crema
con punteggiature rosse intense
*Homogeneous heavy heads,
cream-yellow leaves evenly dotted
of intense red all over*

- Varietà molto produttiva
High-yield variety
- Adatta per raccolte invernali
di dicembre/gennaio
*Suitable for winter harvest
in December/January*
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

da | from a | to da | from

Veneto	20/8	25/8	inizio beg DEC
Marche	20/8	28/8	inizio beg DEC
Fucino	-	-	-
Latina	5/9	12/9	fine end DEC
Sud	25/8	30/8	inizio beg DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
7 piante/m² | 7 plants/m²

Cicorie varie

OTHER CHICORY



4 Sel. Cecilia



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Tardivo - 120/135 giorni
Late - 120/135 days



Peso medio | Average weight
400-500 g



Cespo | Head
Voluminoso, giallo-crema con punteggiature dal rosso al viola
Voluminous heads with cream-yellow leaves variegated from red to purple

- Varietà resistente al freddo
Cold resistant variety
- Adatta per raccolte invernali di gennaio/febbraio
Ideal for winter harvest in January/February
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to		da from
Veneto	20/8	27/8	fine end	DEC
Marche	25/8	30/8	inizio beg	JAN
Fucino	-	-	-	-
Latina	5/9	12/9	inizio beg	JAN
Sud	25/8	30/8	fine end	DEC



Investimento suggerito
Suggested investment
7 piante/m² | 7 plants/m²

Pan di Zucchero



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Medio tardivo - 80/90 giorni
Medium-late - 80/90 days



Peso medio | Average weight
600 g



Cespo | Head
Pesante, allungato, verde chiaro con venature bianche
Heavy, elongated shape, light green with white ribs

- Varietà molto produttiva, resistente al freddo, con cespi alti circa 40 cm
High-yield variety cold resistant, with avg. 40 cm tall heads
- Adatta per raccolte autunnali/invernali
Suitable for autumn/winter harvest
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to		da from
Veneto	10/8	20/8	inizio beg	NOV
Marche	20/8	30/8	inizio beg	NOV
Fucino	1/7	25/7	inizio beg	OCT
Latina	25/8	10/9	metà mid	NOV
Sud	10/8	20/8	inizio beg	NOV



Investimento suggerito
Suggested investment
8-9 piante/m² | 8-9 plants/m²

Catalogna Frastagliata



Ciclo - giorni dal trapianto
Cycle - days after transplant
Medio - 90/95 giorni
Medium - 90/95 days



Peso medio | Average weight
400-500 g



Cespo | Head
Verde intenso, costa bianca, buona frastagliatura
Leaves are well jagged, intense green with white ribs

- Pianta pesante e vigorosa della tipologia "Gigante di Chioggia"
Vigorous heavy plant belong the type "Gigante di Chioggia"
- Adatta per raccolte di novembre/dicembre
Suitable for harvest in November/December
- Adatta per il mercato fresco
Suitable for fresh market



Trapianto | Transplant
Raccolta | Harvest

date suggerite | suggested date

	da from	a to		da from
Veneto	10/8	20/8	metà mid	NOV
Marche	15/8	25/8	metà mid	NOV
Fucino	20/7	30/7	inizio beg	OCT
Latina	20/8	30/8	fine end	NOV
Sud	20/8	30/8	fine end	NOV



Investimento suggerito
Suggested investment
7 piante/m² | 7 plants/m²

Schema riassuntivo

COMPARATIVE TABLE

		VENETO			MARCHE		
	 Ciclo Cycle	Trapianto consigliato Suggested transplant		Raccolta consigliata Suggested harvest	Trapianto consigliato Suggested transplant		Raccolta consigliata Suggested harvest
		da from	a to		da from	a to	
PALLA ROSSA							
1. Sel. Zarlino	60/65	20/7	10/8	metà mid SEP	28/7	10/8	fine end SEP
2. Sel. Chiozzotto	70/75	10/8	15/8	metà mid OCT	10/8	20/8	metà mid OCT
3. Sel. Merlin	80/85	12/8	20/8	fine end OCT	15/8	20/8	inizio beg NOV
4. Sel. Zemei	90/95	15/8	22/8	metà mid NOV	17/8	23/8	metà mid NOV
5. Sel. Renier	100/110	15/8	25/8	inizio beg DEC	20/8	28/8	inizio beg DEC
6. Sel. Morgan	120/125	20/8	28/8	fine end DEC	25/8	3/9	inizio beg JAN
7. Sel. Drake	135/145	20/8	28/8	JAN-FEB	25/8	5/9	JAN-FEB
Variegata Marinanta	135/145	18/8	28/8	JAN-FEB	25/8	5/9	JAN-FEB
PALLA BIANCA							
1. Sel. Canalbianco P.	65/70	25/7	10/8	inizio beg OCT	6/8	12/8	metà mid OCT
2. Sel. Canalbianco M.	85/90	15/8	25/8	metà mid NOV	15/8	25/8	metà mid NOV
3. Sel. Canalbianco T.	110/120	20/8	25/8	metà mid DEC	22/8	30/8	metà mid DEC
SPECIALITÀ							
Giulia	120/130	20/8	30/8	fine end DEC + forcing	20/8	30/8	fine end DEC + forcing
Titti	120/130	20/8	30/8	fine end DEC + forcing	20/8	30/8	fine end DEC + forcing
Verosa	120/125	15/8	22/8	fine end DEC	22/8	28/8	fine end DEC
Mantorosa	120/125	15/8	22/8	fine end DEC	22/8	28/8	fine end DEC
Verona Costarossa	125/130	16/8	23/8	fine end DEC	22/8	28/8	fine end DEC
ROSSA DI TREVISO PRECOCE							
1. Sel. Bellamì	65/70	25/7	5/8	inizio beg OCT	1/8	5/8	inizio beg OCT
2. Sel. Gordon	85/90	10/8	16/8	inizio beg NOV	12/8	20/8	metà mid NOV
3. Sel. Barbarossa	110/120	15/8	22/8	inizio beg DEC	15/8	22/8	metà mid DEC
ROSSA DI TREVISO TARDIVA							
1. Sel. Dolfin	100	1/8	10/8	metà mid NOV + forcing	1/8	10/8	metà mid NOV + forcing
2. Sel. Rinaldi	130	1/8	10/8	metà mid DEC + forcing	1/8	10/8	metà mid DEC + forcing
ROSSA DI VERONA							
1. Sel. Arena Precoce	60/65	1/8	10/8	inizio beg OCT	5/8	12/8	metà mid OCT
2. Sel. Arena Media	80/85	10/8	15/8	inizio beg NOV	15/8	20/8	inizio beg NOV
3. Sel. Arena Tardiva	110/120	15/8	22/8	inizio beg DEC	22/8	28/8	metà mid DEC
VARIEGATA DI LUSIA/CASTELFRANCO E VARIE							
1. Sel. Bornio Precoce	60/65	20/7	10/8	metà mid SEP	31/7	10/8	inizio beg OCT
2. Sel. Bornio Medio	80/90	12/8	20/8	inizio beg NOV	15/8	20/8	metà mid NOV
3. Sel. Bornio Tardivo	115/125	16/8	25/8	metà mid DEC	20/8	25/8	metà mid DEC
1. Sel. Giorgione	65/70	25/7	10/8	inizio beg OCT	1/8	10/8	inizio beg OCT
2. Sel. Tiepolo	85/95	13/8	20/8	inizio beg NOV	18/8	22/8	metà mid NOV
3. Sel. Bellini	105/115	20/8	25/8	inizio beg DEC	20/8	28/8	inizio beg DEC
4. Sel. Cecilia	120/135	20/8	27/8	fine end DEC	25/8	30/8	inizio beg JAN
Pan di Zucchero	80/90	10/8	20/8	inizio beg NOV	20/8	30/8	inizio beg NOV
Catalogna Frastagliata	90/95	10/8	20/8	metà mid NOV	15/8	25/8	metà mid NOV

FUCINO			LATINA			SUD		
Trapianto consigliato Suggested transplant		Raccolta consigliata Suggested harvest	Trapianto consigliato Suggested transplant		Raccolta consigliata Suggested harvest	Trapianto consigliato Suggested transplant		Raccolta consigliata Suggested harvest
da from	a to		da from	a to		da from	a to	
30/4	25/7	fine end JUN	1/8	25/8	inizio beg OCT	1/8	15/8	inizio beg OCT
20/4	10/5	fine end JUN	10/8	25/8	metà mid OCT	8/8	15/8	metà mid OCT
20/7	5/8	metà mid OCT	20/8	5/9	NOV	15/8	20/8	inizio beg NOV
25/7	30/7	fine end OCT	22/8	10/9	fine end NOV	20/8	25/8	fine end NOV
30/7	10/8	fine end NOV	10/9	13/9	metà mid DEC	22/8	28/8	inizio beg DEC
-	-	-	10/9	18/9	metà mid JAN	25/8	30/8	fine end DEC
-	-	-	10/9	15/9	inizio beg FEB	25/8	30/8	JAN
-	-	-	10/9	15/9	fine end JAN	25/8	30/8	JAN
30/6	15/7	inizio beg SEP	10/8	20/8	metà mid OCT	7/8	15/8	metà mid OCT
31/7	5/8	fine end OCT	20/8	5/9	fine end NOV	18/8	25/8	metà mid NOV
-	-	-	5/9	10/9	fine end DEC	25/8	30/8	metà mid DEC
-	-	-	20/8	25/8	metà mid DEC + forcing	20/8	30/8	metà mid DEC + forcing
-	-	-	20/8	25/8	metà mid DEC + forcing	20/8	30/8	metà mid DEC + forcing
-	-	-	5/9	15/9	inizio beg JAN	20/8	30/8	fine end DEC
-	-	-	5/9	15/9	inizio beg JAN	20/8	30/8	fine end DEC
-	-	-	5/9	15/9	JAN	20/8	30/8	inizio beg JAN
5/7	15/7	metà mid SEP	7/8	15/8	metà mid OCT	7/8	12/8	metà mid OCT
15/7	30/7	inizio beg OCT	23/8	5/9	fine end NOV	15/8	20/8	metà mid NOV
-	-	-	1/9	10/9	fine end DEC	15/8	20/8	metà mid DEC
20/7	30/7	fine end OCT+ forcing	12/8	18/8	fine end NOV+ forcing	10/8	15/8	fine end NOV+ forcing
-	-	-	16/8	24/8	fine end DEC + forcing	15/8	20/8	fine end DEC + forcing
1/6	30/6	inizio beg AUG	12/8	18/8	metà mid OCT	6/8	10/8	metà mid OCT
20/7	31/7	inizio beg OCT	20/8	5/9	metà mid NOV	15/8	20/8	inizio beg NOV
-	-	-	5/9	12/9	fine end DEC	22/8	30/8	metà mid DEC
1/6	30/6	inizio beg AUG	5/8	18/8	metà mid OCT	5/8	15/8	metà mid OCT
20/7	31/7	inizio beg OCT	20/8	31/8	inizio beg NOV	16/8	22/8	inizio beg NOV
-	-	-	28/8	5/9	fine end DEC	20/8	25/8	metà mid DEC
10/6	20/6	fine end AUG	1/8	15/8	inizio beg OCT	1/8	10/8	inizio beg OCT
25/7	5/8	metà mid OCT	20/8	10/9	metà mid NOV	15/8	22/8	metà mid NOV
-	-	-	5/9	12/9	fine end DEC	25/8	30/8	inizio beg DEC
-	-	-	5/9	12/9	inizio beg JAN	25/8	30/8	fine end DEC
1/7	25/7	inizio beg OCT	25/8	10/9	metà mid NOV	10/8	20/8	inizio beg NOV
20/7	30/7	inizio beg OCT	20/8	30/8	fine end NOV	20/8	30/8	fine end NOV



Levantia seed srl

Via L. Savoia 18/B | 45014 Porto Viro RO | Italia
Tel. +39 335 5662226 | +39 342 1635715
www.levantiaseed.it | info@levantiaseed.it

N.B. Le varietà fotografate, le descrizioni riportate, i consigli, i suggerimenti tecnici e i cicli colturali sono indicativi. I risultati riportati sono ottenuti in condizioni ottimali di crescita; in nessun caso quanto riportato è da considerarsi completo, e non comporterà alcuna garanzia implicita ed esplicita di raccolto, e non costituirà nessun vincolo contrattuale di qualsiasi natura. L'acquirente e/o il produttore è tenuto a verificare l'adattabilità dei materiali utilizzati, secondo le sue esperienze e conoscenze delle condizioni climatiche locali, dei periodi di coltivazione e semina, e di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del proprio contesto agronomico, culturale, climatico, sanitario e ambientale, rispetto ai prodotti, alle tecniche e alle varietà illustrate, conducendo nel caso dei test di controllo. I documenti e le foto sono riservati. La riproduzione parziale e/o totale è vietata. Questo documento è di proprietà dell'Azienda che non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi, senza il consenso di quest'ultima.

N.B. The photographed varieties and their descriptions, advices, technical tips and crop cycles are approximate. The reported results are obtained in optimal growth conditions. Reported data is not considered complete, and will carry no implicit nor explicit guarantees of harvest, and will not constitute any contractual relationship. Buyer and/or producer must check the suitability of used materials according to his experience and knowledge of local climatic conditions, cultivation and sowing periods, and all the intrinsic and extrinsic features of his own agronomic, crop, climatic, health and environmental context, with respect to the products, techniques and varieties illustrated. Control tests to be carried out, if necessary. Document and pictures are reserved. Partial and/or total copies are banned. This document is property of the Company, it can not be used, copied or disclosed to third parties without the consent of the Company.